

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ³ :		(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO $85/00107$
A61K 31/13, 31/365	A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 17. Januar 1985 (17.01.85)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE (22) Internationales Anmeldedatum: 19. Juni 1984		(europäisches Patent), GB (europäisches Patent), JP,
(31) Prioritätsaktenzeichen: P 3: (32) Prioritätsdatum: 24. Juni 1983	3 23 32 (24.06.)	Mit internationalem Recherchenbericht.
(33) Prioritätsland:	I	DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten aus SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und Bergkamen, Müllerstrasse 170/178 Berlin 65 (DE).	DE/D	회;
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ Eberhard [DE/DE]; Endestrasse 30, D-1000 (DE). KERB, Ulrich [DE/DE]; Prinzregenter D-1000 Berlin 31 (DE).	Berlin	39

(54) Title: PROPHYLAXIS AND THERAPY OF CORONARY HEART DISEASES BY LOWERING THE ESTRO-GEN CONCENTRATION

(54) Bezeichnung: PROPHYLAXE UND THERAPIE VON KORONAREN HERZKRANKHEITEN DURCH SEN-KUNG DES ÖSTROGENSPIEGELS

(57) Abstract

Utilisation of antiestrogen and aromatase inhibitors, optionally in combination with β -receptor blockers for the prophylaxis and therapy of coronary heart diseases. Substances such as tamoxifen are considered to be used as antiestrogen, and such as testolactone to be used as aromatase inhibitors.

(57) Zusammenfassung

Verwendung von Antiöstrogenen und Aromatasehemmern, gegebenenfalls in Kombination mit β -Receptorenblokkern, zur Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten. Als Antiöstrogenen kommen Substanzen wie Tamoxifen und als Aromatasehemmer solche wie Testolacton infrage.

ATTORNEY DOCKET NUMBER:10177-211-999 (Cam-no.008563-999208 SERIAL NUMBER: 09/910,388 REFERENCE: **B21**

BEST AVAILABLE COPY

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB BE BG BR CF CG CH CM DE	Österreich Australien Barbados Belgien Bulgarien Brasilien Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Kamerun Deutschland, Bundesrepublik	FR GA GB HU II JP KP KR LI LK LU MC	Frankreich Gabun Vereinigtes Königreich Ungarn Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg Monaco	ML MR MW NL NO RO SD SE SN SU TD TG	Mali Mauritanien Malawi Niederlande Norwegen Rumänien Sudan Schweden Senegal Soviet Union Tschad
DK	Dänemark	MC	Monaco	TG	Togo
FI	Finnland	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika

- 1 -

Prophylaxe und Therapie von koronaren

Herzkrankheiten durch Senkung des Östrogenspiegels

Die Erfindung betrifft die Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten durch Senkung des Östrogenspiegels. Koronare Herzkrankheiten gehören zu den häufigsten lebensbedrohenden Gefäßerkrankungen. Zur Behandlung dieser Krankheiten verwendet man mehrere Präparate, die einmal auf das Gefäßsystem erweiternd wirken, die die gestörte Sauerstoffversorgung des Herzmuskelgewebes (Myocard) verbessern und die dazu noch die Bildung von Blutgerinseln (Thrombozytenaggregation) verhindern sollen. Darüber hinaus wird auch der Blutdruck medikamentös gesenkt.

Obwohl seit vielen Jahren bekannt ist, daß Männer mit koronaren Herzkrankheiten wie Angina pectoris, Koronarinsuffizienz, drohendem oder eingetretenem Herzinfarkt im Serum erhöhte Östrogenspiegel aufweisen, hat man noch niemals versucht, eine Behandlung vorzunehmen, bei der der Östrogenspiegel gesenkt wird.

Eine Behandlung durch Senkung des Östrogenspiegels wurde bisher nur bei Erkrankungen endokriner Drüsen vorgeschlagen, zum Beispiel bei Mammakarzinom (US-Patent 4.235.893, Endocrinology 100 (1977) 1684 - 1695), Prostatahyperplasie (DE-OS 2 817 157 und DE-OS 3 121 153) oder Oligospermie (J. Clin. End. and Met. 52 (1981) 897 - 902).

Zur Senkung des Östrogenspiegels kommen Antiöstrogene wie Tamoxifen und insbesondere Aromatasehemmer wie Testolacton infrage.



Man hat festgestellt, daß der Serumöstradiolspiegel bei Männern mit koronaren Herzkrankheiten signifikant höher liegt als bei gesunden Männern (The American Journal of Medicine 74 (1983) 863 - 869). Ebenso sind die Serum-östrogenspiegel bei Männern mit akutem Herzinfarkt erhöht (The American Journal of Medicine 73 (1982) 872 - 881).

Ferner ist bekannt, daß Aromatasehemmer den Östrogengehalt im Plasma senken (J. Clin. and Met. 52 (1981) 897 - 902).

Es wurde nun gefunden, daß durch Verabreichung von Aromatasehemmern auch der Östrogengehalt im Herzvorhof (Atrium cordis) vermindert werden kann.

Behandelt man geriatrische Rattenböcke (Alter ca. 2 Jahre) über 8 Tage subkutan mit einem Aromatasehemmer, wie zum Beispiel täglich 6 mg 4-Hydroxy-4-androsten-3,17-dion, und senkt damit den Östrogengehalt im Plasma, so findet man nach Gabe von (³H)-Östradiol einen überraschenden Anstieg der Tritiumaufnahme im Atrium gegenüber einer nicht mit 4-Hydroxy-4-androsten-3,17-dion behandelten Kontrollgruppe. Hieraus läßt sich schließen, daß der Aromatasehemmer den Östrogenspiegel insgesamt im Organismus senkt und damit auch den Einbau von Östrogenen im Atrium vermindert. Mit der dann folgenden Zugabe von spezifisch hoch Tritium-markiertem Östradiol (1 µg 3,17-Dihydroxy-1,3,5(10)- $\sqrt{2}$,4,6,7,16,17- 3 H7-estratrien) findet eine bevorzugte Aufnahme in die an Östrogen verarmten Östrogenrezeptoren im Atrium statt. Der Faktor der Anreicherung gegenüber der Kontrollgruppe beträgt 3 und bestätigt damit die hohe Bedeutung, die im Zusammenhang zwischen Östrogenspiegel im Plasma, Östrogenauffindung im Herzmuskel und koronaren Erkrankungen gegeben ist.



4

- 3 -

Erste Ergebnisse einer Nacharbeitung einer in Science 196 (1977) 319 - 321 publizierten Arbeit von Stumpf et al. zeigen nach Applikation von (³H)-Östradiol bei nicht vorbehandelten 2 Jahre alten Rattenböcken einen etwa 3fach höheren Östrogengehalt im Atrium als in anderen Teilen des Herzens oder im Plasma.

Aus in vitro-Untersuchungen zur Aromatasehemmwirkung mit ß-Receptoren-Blockern in Sertoli-Zellen (Molecular and Cellular Endocrinology, 13 (1979) 241 - 253) ist bekannt, daß eine durch Inkubation mit Testosteron und Stimulation mit Epinephrin um den Faktor 9 verstärkte Bildung von Östradiol durch Zusatz von Propranolol auf das 2fache der Östradiolbildung gegenüber der Kontroll-gruppe abfällt.

In neuen von V. Hansson, Oslo, durchgeführten in vitroStudien wurde nun gefunden, daß sowohl ß-Receptorenblocker, wie Propranolol und Mepindolol, als auch
Aromatasehemmer, wie Testolacton und 4-Hydroxy-4androsten-3,17-dion, in Sertoli-Zellkulturen eine durch
Isoproterenol induzierte Aromatisierung zu hemmen vermögen. Hier bietet sich eine Parallele in der Wirkungsweise von ß-Blockern und Aromatasehemmern an. Wenn auch
der biochemische Angriffspunkt im Ablauf der Ereignisse,
die zur Aromatisierung führen, ein anderer ist, so bleibt
letztlich beiden Stoffklassen gemeinsam eine Minderung
des endogenen Östrogengehalts.

Aus den Ergebnissen der Studien von Hansson läßt sich folgern, daß die Aromatasehemmwirkung - mit ihrer Konsequenz einer verminderten Östrogenbildung - auch das Wirkprofil der ß-Blocker prägt. So wie Isoproterenol sollte auch Adrenalin (Epinephrin) die Aromatisierung induzieren. ß-Blocker greifen zweimal in den Östrogenbildungsregelmechanismus ein. Einmal über eine verminderte



- 4 -

Adrenalinausschüttung per se und Blockierung des Angriffspunktes von Adrenalin (ß-Receptoren) und der damit
geringeren Stimulierung einer Aromatisierung und zum
anderen über die nachgewiesene sekundäre Hemmwirkung
auf die als Folge der Stimulierung anlaufende Aromatisierung.

Erste klinische Versuche mit dem Aromatasehemmer Testolacton bei Patienten mit koronaren Herzkrankheiten sind vielversprechend.

In einem Fall ließen Angina-pectoris-Beschwerden schon nach 4wöchiger Einnahme von täglich je 2 mal 100 mg
Testolacton nach und verschwanden schließlich völlig.
Das durch Krampf- und Angstzustände gekennzeichnete
Krankheitsbild wurde vom Patienten nicht mehr empfunden.
Die Therapie wurde 5 Monate fortgesetzt. In dieser Zeit
traten nur noch einmal kurzfristig Herzbeschwerden auf,
die jedoch den früheren schmerzhaften Schweregrad nicht
erreichten.

Auch nach Absetzen des Testolactons blieben die Beschwerden aus, und der Patient ist weiterhin - nach Ablauf von weiteren 8 Monaten - beschwerdefrei. Da ein lebensbedrohender Zustand nicht vorlag, kann mit der Medikation so lange ausgesetzt werden, bis erneut Beschwerden eintreten, die dann nach Einsatz einer Erhaltungsdosis wieder zum Verschwinden gebracht werden können.

Die Dosierung des Antiöstrogens bzw. des Aromatasehemmers richtet sich nach der Art und Schwere der Herzkrankheit. Im allgemeinen wird man mit einer täglichen Dosis eines Antiöstrogens, die der von 10 bis 200 mg Tamoxifen entspricht, oder eines Aromatasehemmers, die der von 50 bis 1000 mg Testolacton entspricht, auskommen.



4

Zur Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten sind erfindungsgemäß alle Stoffe geeignet, die eine Senkung des Östrogenspiegels bewirken. Zu diesen Stoffen zählen alle Antiöstrogene, die sowohl steroidal als auch nicht-steroidal sein können. Zu den am besten untersuchten nicht-steroidalen Antiöstrogenen zählen:

Tamoxifen ((Z)-2-/p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)-phenoxy/-N,N-dimethylethylamin) und dessen Salze,
Clomifen (1-/p-(ß-diethylaminoethoxy)phenyl/-1,2-diphenylchlorethylen,
Cyclofenil (Bis(p-acetoxyphenyl)cyclohexylidenmethan,
Nafoxidin (1-(2-/4-(6-Methoxy-2-phenyl-3,4-dihydro-1-naphthyl)phenoxy/-ethyl)-pyrrolidin, hydrochlorid u.a.

Als Beispiele für steroidale Antiöstrogene seien 11α -Methoxy- 17α -ethinyl-östradiol und 16β -Ethylöstradiol genannt.

Ein Übersichtsreferat über die "Pharmalogie der Antiöstrogene", in dem noch weitere Antiöstrogene abgehandelt werden, ist publiziert in "Gynäkologe" 12 (1979) 199 - 211, Springer-Verlag.

Da die beim Manne vorhandenen Östrogene vorwiegend aus der peripheren Aromatisierung von androgenen Hormonen stammen (Excerpta Medica 1979, 42 - 50 und J. Clin. Endocrinol. Metab. 27 (1967) 1103 - 1111), sind Aromatasehemmer zur Senkung des Östrogenspiegels beim Manne besonders gut geeignet. Durch Verabreichung von Aromatasehemmern wird die Bildung von biologisch wirksamen Östrogenen (Östrogenbiosynthese) verhindert bzw. gehemmt. Erfindungsgemäß sind alle Aromatasehemmer geeignet, die die Östrogenbiosynthese hemmen und selbst nur geringe oder keine östrogene oder andere hormonelle Wirkung entfalten. Aromatasehemmer gemäß



PCT/DE84/00137

- 6 -

vorliegender Erfindung sind zum Beispiel
Testolacton (17a-0xa-D-homo-androsta-1,4-dien-3,17-dion,
Androst-4-en-4-ol-3,17-dion (Endocrinology 100 (1977)
1684 - 1695),

Ester des Androst-4-en-4-ol-3,17-dions (US-Patent 4 235 893).

Weitere geeignete Aromatasehemmer werden beschrieben beispielsweise in Endocrinology 92 (1973) 866 - 880, DE-OS 3 124 719 und US-Patent 4 289 762.

Die Erfindung betrifft auch Mittel zur Senkung des Östrogenspiegels für die Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten bei Männern, wobei Antiöstrogene und insbesondere Aromatasehemmer zur Senkung des Östrogenspiegels geeignet sind.

Die Wirkstoffe (Östrogenspiegelsenker) können mit den in der galenischen Pharmazie üblichen Zusätzen, Trägersubstanzen und/oder Geschmackskorrigentien nach an sich bekannten Methoden zu den üblichen Applikationsformen verarbeitet werden, beispielsweise für die orale, perkutane oder parenterale Applikation.

Für die bevorzugte orale Applikation kommen insbesondere Tabletten, Dragées, Kapseln, Pillen, Suspensionen oder Lösungen infrage.

Die wie oben angegeben formulierten Arzneimittel enthalten vorzugsweise

10 - 100 mg Tamoxifen oder biologisch äquivalente Mengen eines anderen Antiöstrogens oder

50 - 200 mg Testolacton oder biologisch äquivalente Mengen eines anderen Aromatasehemmers.



3

- 7 -

Darüber hinaus können zur Behandlung von Herzkrankheiten gemäß vorliegender Erfindung auch Antiöstrogene oder Aromatasehemmer mit ß-Receptorenblockern gemeinsam verabreicht werden. Antiöstrogene und ß-Receptorenblocker oder Aromatasehemmer und ß-Receptorenblocker werden vorzugsweise gleichzeitig in getrennten oder einheitlichen Dosiseinheiten appliziert.

ß-Receptorenblocker werden zusammen mit Antiöstrogenen oder Aromatasehmmern in gleicher Form und gleicher oder bis auf die Hälfte herabgesetzter Menge im Vergleich zu der Behandlung mit ß-Blockern allein appliziert.

Das Gewichtsverhältnis von Aromatasehemmer zu ß-Blocker liegt für Testolacton als Aromatasehemmer und Propranolol als ß-Blocker etwa bei 1 : 1 bis 15 : 1. Je nach der Wirkungsstärke der Wirkstoffe kann das Gewichtsverhältnis der Kombination entsprechend angepaßt werden.

Als ß-Receptorenblocker sind außer Propranolol auch alle anderen bekannten ß-Blocker geeignet, wie zum Beispiel Oxprenolol, Nadolol, Pindolol, Mepindolol, Sotalol usw.



Beispiel 1

100,0 mg 17a-0xa-D-homoandrosta-1,4-dien-3,17-dion (Testolacton)

80,5 mg Lactose

39,5 mg Maisstärke

2,5 mg Poly-N-Vinylpyrrolidon 25

2,0 mg Aerosil

0,5 mg Magnesiumstearat

225,0 mg Gesamtgewicht der Tablette, die in üblicher Weise auf einer Tablettenpresse hergestellt wird.

Beispiel 2

50,0 mg 17a-0xa-D-homoandrosta-1,4-dien-3,17-dion (Testolacton)

115,5 mg Lactose

54,5 mg Maisstärke

2,5 mg Poly-N-Vinylpyrrolidon 25

2,0 mg Aerosil

0,5 mg Magnesiumstearat

225,0 mg Gesamtgewicht der Tablette, die in üblicher Weise auf einer Tablettenpresse hergestellt wird.



_ 9 -

Beispiel 3

Zusammensetzung einer öligen Lösung:

50,0 mg 17a-0xa-D-homoandrosta-1,4-dien-3,17-dion (Testolacton)

378,4 mg Rizinusöl

643,6 mg Benzylbenzoat

1072,0 mg ² 1 ml Lösung

Die Lösung wird in eine Ampulle gefüllt und sterilisiert.

Beispiel 4

Zusammensetzung einer Tablette:

20,0 mg (Z)-2-/p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)-phenoxy/-N,N-dimethyläthylamin (Tamoxifen)

120,5 mg Lactose

59,5 mg Maisstärke

2,5 mg Poly-N-Vinylpyrrolidon 25

2,0 mg Aerosil

0,5 mg Magnesiumstearat

205,0 mg Gesamtgewicht der Tablette, die in üblicher Weise auf einer Tablettenpresse hergestellt wird.



PCT/DE84/00137

Patentansprüche

1.) Mittel zur Senkung des Östrogenspiegels für die Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten bei Männern.

- Mittel nach Anspruch 1 auf Basis eines Antiöstrogens, gegebenenfalls in Kombination mit einem β-Receptorenblocker.
- 3.) Mittel nach Anspruch 1 auf Basis eines Aromatasehemmers, gegebenenfalls in Kombination mit einem ß-Receptorenblocker.
- 4.) Mittel nach Anspruch 1 in einer oralen Applikationsform.
- 5.) Mittel nach Anspruch 1 für die perkutane oder parenterale Applikation.
- 6.) Mittel nach Anspruch 1, enthaltend 10 100 mg
 Tamoxifen oder biologisch äquivalente Mengen eines
 anderen Antiöstrogens.
- 7.) Mittel nach Anspruch 1, enthaltend 50 200 mg Testolacton oder biologisch äquivalente Mengen eines anderen Aromatasehemmers.
- 8.) Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten bei Männern durch Senkung des Östrogenspiegels.
- 9.) Verwendung von Antiöstrogenen, gegebenenfalls in Kombination mit β-Blockern zur Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten nach Anspruch 8.



- 10.) Verwendung von Tamoxifen gemäß Anspruch 9.
- 11.) Verwendung von täglich 10 200 mg Tamoxifen bzw. biologisch äquivalente Mengen eines anderen Antiöstrogens nach Anspruch 9.
- 12.) Verwendung von Aromatasehemmern, gegebenenfalls in Kombination mit ß-Blockern, zur Prophylaxe und Therapie von koronaren Herzkrankheiten nach Anspruch 8.
- 13.) Verwendung von Testolacton gemäß Anspruch 12.
- 14.) Verwendung von täglich 50 1000 mg Testolacton bzw. biologisch äquivalente Mengen eines anderen Aromatasehemmers nach Anspruch 12.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 84/00137

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) 8				
According	to internat	ional Patent Classification (IPC) or to both Na	tional Classification and IPC	
Int.	C1. ³ : A 6	1 K 31/13; A 61 K 31/365		
II. FIELD	S SEARCE		ntation Searched 4	
Classificati	an Sustain	Minimum Docume	Classification Symbols	
Ciassinicati	on System		Classification dynamics	
	_			
Int. (C1. ³	A 61 K 31/00		
	······	Documentation Searched other	than Minimum Documentation	
	•	to the Extent that such Documents	are included in the Fields Searched 5	
III. DOCU	MENTS C	ONSIDERED TO BE RELEVANT 14		Relevant to Claim No. 15
Category *	Citat	on of Document, 16 with Indication, where app	ropriate, of the relevant passages 17	Relevant to Claim No. 15
x	GB, A,	2078749 (MERRELL DOW) 13 Janu lines 22.23	ary 1982, see page 1, in particular	1-4.8.9.12.14
x	US, A.	4289762 (B.W.METCALF) 15 Septer 65-68; column 3, lines 1,2	nber 1981, see column 2, lines .	1-4.8.9.12.14
х	LU. A.	83544 (SCHERING AG) 01 December	er 1981, see claims	3,7,12-14
х				6,7.10,12-14
			1	
				•
			·	
				
"A" doc	ument defin	of cited documents: ¹⁵ ing the general state of the art which is not e of particular relevance	"T" later document published after the or priority date and not in conflicted to understand the principle	t with the application out
"E" leari filin	ier documer g date	it but published on or after the International	"X" document of particular relevance cannot be considered novel or o	e; the claimed invention cannot be considered to
whi	ch is cited i	h may throw doubts on priority claim(s) or to establish the publication date of another	involve an inventive step "Y" document of particular relevance	the claimed invention
cital	tion or othe	r special reason (as specified) ring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve a document is combined with one of	r more other such docu-
othe	er means	shed prior to the international filing date but	ments, such combination being of in the art.	
		riority date claimed	"&" document member of the same pa	itent family
	IFICATION			
		mpletion of the International Search 3	Date of Mailing of this International Sea	
13 Se	eptember	1984 (13.09.84)	01 October 1984 (01.10.84	·)
Internation	al Searchin	g Authority 1	Signature of Authorized Officer 20	
Euro	pean Pate	nt Office		

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/DE 84/00137 (SA

7403)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 25/09/84

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB-A- 2078749	13/01/82	BE-A- 889401 FR-A,B 2485543 NL-A- 8103101 JP-A- 57038797 US-A- 4322416 SE-A- 8103963 AU-A- 7237081 DE-A- 3124780 CA-A- 1173431 GB-A- 2135314	28/12/81 31/12/81 18/01/82 03/03/82 30/03/82 28/12/81 07/01/82 03/06/82 28/08/84 30/08/84
US-A- 4289762	15/09/81	BE-A- 889404 GB-A- 2078750 FR-A,B 2485544 NL-A- 8103098 JP-A- 57038798 DE-A- 3124719 SE-A- 8103988 AU-A- 7236981 CA-A- 1173432	28/12/81 13/01/82 31/12/81 18/01/82 03/03/82 18/03/82 28/12/81 07/01/82 28/08/84
LU-A- 83544	01/12/81	BE-A- 890521 DE-A- 3121153 JP-A- 57193411 GB-A- 2100601 NL-A- 8103874 AU-A- 8407482	29/03/82 09/12/82 27/11/82 06/01/83 16/12/82 25/11/82

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 84/00137

I. KLASS	KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) ³				
Nach der	ach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC				
Int.	K1.3:	A 61 K 31/13; A 61 K	31/365		
II. RECH	ERCHIERTE	SACHGEBIETE			
		Recherchierter	Mindestprüfstoff ⁴		
Klassıfikat	ionssystem		Klassifikationssymbole		
Int	.Kl.³	A 61 K 31/00			
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff unter die recherchier	gehörende Veröffentlichungen, soweit die ten Sachgebiete fällen ³	se	
	•				
		'ERÓFFENTLICHUNGEN' ¹¹	- 11 15		
Art*		nnung der Veröffentlichung, soweit erforderlic		Betr. Anspruch Nr. 18	
X	1	, 2078749 (MERRELL DO 982, siehe Seite 1, i eilen 22,23	W) 13. Januar .nsbesondere	1-4,8,9,12, 14	
x	1	, 4289762 (B.W. METCA 981, siehe Spalte 2, Z palte 3, Zeilen 1,2	LF) 15. September eilen 65-68;	1-4,8,9, 12,14	
х		, 83544 (SCHERING AG) 981, siehe Ansprüche	1. Dezember	3,7,12-14	
х	The Merck Index, tenth edition, veröffent- licht in 1983, siehe Seite 1300, compound 8923; Seite 1312, compound 8999			6,7,10,12-14	
					
'A" Ver def def def def nat	offentlichun mert. aber n res Dokume ronaten Anm offentlichungsc annten Verc em anderen uhrt) offentlichun e Benutzung reht offentlichun i, aber nach entlicht word EINIGUNG	rien von angegebenen Veröffentlichungen is: ig. die den allgemeinen Stand der Technik nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist int, das jedoch erst am oder nach dem inter- neldedatum veröffentlicht worden ist ig, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch cheinen zu lassen, oder durch die das Ver- latum einer anderen im Recherchenbericht iffentlichung belegt werden soll oder die aus besonderen Grund angegeben ist (wie aus- ig, die sich auf eine mundliche Öffenbarung, i, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen g, die vor dem internationalen Anmeldeda- i dem beanspruchten Prioritätsdatum ver- len ist s der internationalen Recherche* ber 1984	"T" Spätere Verolfentlichung, die nac meldedatum oder dem Prioritäts den ist und mit der Anmeldung nizum Verstandnis des der Erfin Prinzips oder der ihr zugrundelichen ist "X" Verolfentlichung von besondere spruchte Erfindung kann nicht inscher Tätigkeit berühend betrach verolfentlichung von besondere spruchte Erfindung kann nicht all keit berühend betrachtet werden, mit einer oder mehreren anderer ser Kategorie in Verbindung gebindung für einen Fachmann nah "8" Verolfentlichung, die Mitglied der Absendedatum des internationalen Rec	datum veroffentlicht wor- cht kollidiert, sondern nur dung zugrundeliegenden igenden Theorie angege- ier Bedeutung: die bean- als neu oder auf erfinde- hiet werden ier Bedeutung: die bean- is auf erfinderischer Tätig- wenn die veröffentlichung in Veroffentlichungen die- racht wird und diese Ver- eliegend ist selben Patentfamilie ist	
				herator 4	
Internation		henbehorde ¹	Unterschrift des bevollmachtigten Bed		
	Europäisches Patentamt G.L.M. KRUYDENBERG				

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT UBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 84/00137 (SA 7403)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 25/09/84

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

			·	
<pre>Im Recherchenbe- richt angeführtes</pre>	Datum der Veröffent-	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffent-
Patentdokument	lichung			lichung
racentdokument	Trending			rrending
GB-A- 2078749	13/01/82	BE-A-	889401	28/12/81
	•	FR-A,B	2485543	31/12/81
		NL-A-	8103101	18/01/82
		JP-A-	57038797	03/03/82
		US-A-	4322416	30/03/82
		SE-A-	8103963	28/12/81
		AU-A-	7237081	07/01/82
		DE-A-	3124780	03/06/82
		CA-A-	1173431	28/08/84
		GB-A-	2135314	30/08/84
US-A- 4289762	15/09/81	BE-A-	889404	28/12/81
05-R- 42897,02	13/03/01	GB-A-	2078750	13/01/82
		FR-A,B	2485544	31/12/81
		NL-A-	8103098	18/01/82
		JP-A-	57038798	03/03/82
		DE-A-	3124719	18/03/82
		SE-A-	8103988	28/12/81
		AU-A-	7236981	07/01/82
		CA-A-	1173432	28/08/84
LU-A- 83544	01/12/81	BE-A-	890521	29/03/82
TO-Y- 92244	01/12/81	DE-A-	3121153	09/12/82
		JP-A-	57193411	27/11/82
		GB-A-	2100601	06/01/83
		NL-A-	8103874	16/12/82
		AU-A-	8407482	25/11/82
		10-n-	0407402	23/11/02

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потивр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.